

## POLIMUN ND inac, ПОЛІМУН НХ інак



вакцина проти ньюкаслської хвороби, інактивована

СКЛАД	Активнодіюча речовина: в дозі (0,1 мл) вірус Ньюкаслської хвороби штам «Ла-Сота» ДК-124 $\geq 10^9$ ЕІД <sub>50</sub> до інактивації.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА	Емульсія.
ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ	Вакцина забезпечує захист щепленої птиці від захворювання на Ньюкаслську хворобу починаючи з 14 доби після введення. Лікувальними властивостями не володіє.
ВІД ПТИЦІ	Домашня птиця (кури, індики, голуби).
ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ	Для профілактики захворювань птиці на ньюкаслську хворобу.
ПРОТИПОКАЗАННЯ	Не вакцинують кволу, хвору птицю.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ	Перед введенням вакцину підігрівають до кімнатної температури. Не використовують вакцину у флаконах з тріщинами, без етикеток, порушенням укупорювання, заморожену, не використану впродовж трьох годин з моменту першого відбору або з закінченим терміном придатності.
ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЗАСОБАМИ	Не змішують з іншими лікувальними і профілактичними засобами.
ОСОБЛИВІ ВКАЗІВКИ (ПРИ НЕСУЧОСТІ)	Не застосовують.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ	Вакцину вводять в дозі по 0,1 мл курчатам з добового віку внутрішньом'язово в ділянку стегна або грудних м'язів або підшкірно - в верхню третину ділянки шиї.
ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ	Безпечна при введенні 2-х доз.
ПЕРІОД ВІВЕДЕННЯ (КАРЕНЦІЇ)	Нуль діб.

<b>СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ОСІБ І ОБСЛУГОВОЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬ ВІП</b>	Необхідно дотримуватись правил асептики, особистої гігієни та техніки безпеки при роботі з птицею. У разі випадкової самоін'екції необхідно негайно звернутись за медичною допомогою, маючи при собі листівку-вкладку на даний препарат.
<b>ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З НЕВИКОРИСТАНИМ ВІП, СПОСОБИ ЙОГО ЗНЕШКОДЖЕННЯ І УТИЛІЗАЦІЇ</b>	Невикористану вакцину, з закінченим терміном дії, шприці з голками знезаражують кип'ятінням впродовж 30 хвилин.
<b>ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ</b>	24 місяці. Три години після першого відбору вакцини.
<b>УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ</b>	Зберігають за температури від 2 до 8 °C у темному, не доступному для дітей місці. Не заморожувати!
<b>УПАКОВКА</b>	Флакони зі пластику або скла по 50, 100, 1000, 2000, 2500 або 5000 доз вакцини, закриті гумовими пробками та закатані алюмінієвими ковпачками.
<b>НАЗВА ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ВЛАСНИКА РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ</b>	ТОВ „БІОТЕСТЛАБ” 08600 Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська 57-А. Адреса виробництва: 03145 м. Київ, вул. Академіка Лебедєва 1; 08600 Київська обл., м. Васильків, вул. Лістрового Олександра, буд. 1/3.
<b>ПРАВИЛА ВІДПУСКУ</b>	За рецептром.
<b>ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ</b>	Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до “Вказівки про порядок пред’явлення рекламицій на біологічні препарати, що призначенні для застосування у ветеринарній медицині” від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.