

ФЛОКСИ-СПРЕЙ

Флуорфенікол 2,5%



СУЧАСНА АЛЬТЕРНАТИВА
КЛАСИЧНИМ СПРЕЯМ



ФЛУОРФЕНІКОЛ: НОВИЙ СТАНДАРТ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОТИМІКРОБНИХ СПРЕЇВ

ШИРОКИЙ СПЕКТР ДІЇ

Грам(+), Грам(-) бактерії, мікоплазми

АКТИВНІСТЬ ПРОТИ ГРАМ(-) БАКТЕРІЙ


Включно з тетрациклін-резистентними штамми

НИЗЬКИЙ РИЗИК РЕЗИСТЕНТНОСТІ

Завдяки іншому механізму дії

ВИСОКА СТАБІЛЬНІСТЬ

Ефективність при гнійно-некротичних ураженнях



ФЛОКСИ-СПРЕЙ VS КЛАСИЧНІ СПРЕЇ

	ТЕТРАЦИКЛІНОВІ СПРЕЇ		ФЛОКСИ-СПРЕЙ
Діюча речовина	Хлортетрациклін	Окситетрациклін	Флуорфенікол
Тип дії	Бактеріостатична	Бактеріостатична	Бактеріостатична
Дія на Грам(+) бактерії	Висока	Висока	Висока
Дія на Грам(-) бактерії	Часто слабка, ризик резистентності	Помірна, залежить від штаму	Висока, включно з резистентними штамми
Резистентність	Висока (ТЕТ-гени), особливо при тривалому застосуванні		Низька
Стабільність у некротизованих ранах	Низька (органічні матеріали, іони Ca/Mg знижують ефективність)		Висока

ФЛОКСИ-СПРЕЙ: альтернатива тетрацикліновим спреям з широким спектром дії, високою ефективністю проти тетрациклін-резистентних бактерій та стабільністю у складних випадках

ФЛОКСИ-СПРЕЙ: МАКСИМУМ ВПЕВНЕНОСТІ — У КОЖНОМУ НАТИСКАННІ



ОПТИМІЗОВАНА ФОРМУЛА

- Без кристалізації вмісту
- Однорідність під час зберігання
- Безпечний харчовий барвник

ВИСОКОЯКІСНИЙ ФЛАКОН

- Рівномірне розпилення
- Висока герметичність
- Ергономічний дизайн


ПРОЛОНГОВАНА ДІЯ

- Надійна фіксація на шкірі
- Глибоке проникнення в місце інфекції
- Захист від повторної контамінації




ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗУВАННЯ

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ						
Ознаки гнійно-некротичних, інфекційних уражень кінцівок	•	•	•	•	•	•
Гострі запальні процеси в ділянці пупкового канатика	•	•	•	•	•	•
Обробка шкіри після хірургічних втручань	•	•	•	•	•	•
Травматичні ушкодження шкіри (рани, тріщини, подряпини, розчісування, укуси, забої, виразки)	•	•	•	•	•	•
Дерматити бактеріального походження, що спричинені мікроорганізмами чутливими до флуорфеніколу	•	•	•	•	•	•
Перед нанесенням препарату уражену ділянку ретельно очищують від ексудату, некротизованих тканин.						



Струсити флакон



Піднести до місця ураження



Розпилити 1-2 рази



Повторювати кожні 12 год.

РЕКОМЕНДОВАНИЙ КУРС — 10 ДІБ

КАРЕНЦІЯ — 0 ДІБ. Не розпилювати спрей на вим'я тварин, молоко яких використовується для споживання людьми та вигодовування тварин.

Виробник:



ТОВ «БІОТЕСТЛАБ»
тел.: +380 44 245 77 25
www.biotestlab.ua



Генеральний дистриб'ютор:



ТОВ «ТД БІОТЕСТЛАБ»
тел.: 0 800 213 235
www.biotestlab.shop