

NEW

# МАРОКС

Швидкий контроль блювоти,  
коли це важливо вже зараз



Фасування – 10 мл, 20 мл

Лікування та профілактика нудоти  
і блювоти у собак та котів

Склад:  
В 1 мл: маропітант – 10 мг.  
(розчин для ін'єкцій)

Показання до застосування:

- Лікування та профілактики нудоти у собак і котів, у т.ч. спричинених хіміотерапією
- Лікування блювоти в поєднанні з іншими підтримуючими заходами
- Попередження післяопераційної нудоти та блювоти і покращення відновлення після загальної анестезії




- Блокування нейрокінінових рецепторів, що викликають блювоту
- Помітна дія через 30-60 хвилин – ідеально для невідкладних станів
- Тривалість терапевтичного ефекту – до 24 годин
- Надійний контроль післяопераційної нудоти та нудоти, спричиненої хіміотерапією
- Гнучкість введення, зручність дозування
- Відсутність седативного ефекту
- Має аналгізуючий ефект

| Застосування           | Лікування                                         |                                                             | Профілактика                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Вид та вік тварини     | Собаки<br>2-4 місяці                              | Собаки, коти від<br>4-х місяців і старше                    | Собаки, коти від<br>4-х місяців і старше                       |
| Доза і спосіб введення | 1 мг на 1 кг м.т.<br>(1 мл на 10 кг м.т.)<br>п/ш* | 1 мг на 1 кг м.т.<br>(1 мл на 10 кг м.т.)<br>п/ш* або в/в** | 1 мг на 1 кг м.т.<br>(1 мл на 10 кг м.т.)<br>п/ш* або в/в**    |
| Курс                   | 1 раз на добу<br>до 5 діб поспіль                 |                                                             | За 60 хв. до введення препарату,<br>що може спричинити блювоту |

\*При підшкірному введенні препарату

\*\*Внутрішньовенне введення слід проводити протягом 1-2 хв., не змішуючи препарат з іншими розчинами




Застосовувати охолодження\* при підшкірному введенні



Підшкірно або внутрішньовенно



1 мг на 1 кг м.т.



1 раз на добу до 5 діб поспіль