

ДОКСАН-50

Доксицикліну гіклат 50%

Порошок для приготування перорального розчину





РЕСПІРАТОРНІ + КИШКОВІ ІНФЕКЦІЇ
ПІД КОНТРОЛЕМ

Інформація призначена для спеціалістів ветеринарної медицини.
Застосування здійснюється згідно з інструкцією. РП № АВ-09389-01-20



ДОКСАН-50



T_{max}: 2–4 год
Швидка концентрація
в сироватці крові

18-24 год
Тривала терапевтична
концентрація

ЦІЛЬОВА ДІЯ — ЛЕГЕНІ
Добре проникає
в легеневу тканину

БРОНХОПНЕВМОНІЯ
Pasteurella multocida,
Streptococcus suis,
Mycoplasma hyorhinis

ПЛЕВРОПНЕВМОНІЯ
Actinobacillus
pleuropneumoniae

АТРОФІЧНИЙ РИНИТ
Pasteurella multocida,
Bordetella bronchiseptica

ЕНТЕРОІНФЕКЦІЇ
E. coli та інші збудники,
чутливі до доксицикліну

2 г / 100 кг
добова потреба
× 5 діб

1 КГ = КУРС НА 10 ТОНН ЖИВОЇ МАСИ

5 діб
терапії



10 000 кг
живої маси



1 кг
ДОКСАН-50

РОЗРАХУНОК НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ

доза препарату
на кг. м.т. на добу (мг)



середня маса тіла
тварини (кг)



середнє добове споживання води (літри) на одну тварину

кількість препарату
на літр питної води

- Маточний розчин — 200 г/л для подальшого розведення до терапевтичної концентрації або застосування через водний медикатор.
- Свіжий розчин препарату необхідно готувати щодня.
Каренція: 8 діб.

Виробник:



ТОВ «БІОТЕСТЛАБ»
тел.: +380 44 245 77 25
www.biotestlab.ua



Генеральний дистриб'ютор:



ТОВ «ТД БІОТЕСТЛАБ»
тел.: 0 800 213 235
www.biotestlab.shop