

# ДОКСАН-50

Доксицикліну гіклат 50%

Порошок для приготування перорального розчину




РЕСПІРАТОРНІ + КИШКОВІ ІНФЕКЦІЇ  
ТЕЛЯТ ПІД КОНТРОЛЕМ

Інформація призначена для спеціалістів ветеринарної медицини.  
Застосування здійснюється згідно з інструкцією. РП № АВ-09389-01-20




# ДОКСАН-50



**T<sub>max</sub>: 2–4 год**  
Швидка концентрація  
в сироватці крові



**18-24 год**  
тривала терапевтична  
концентрація




**ЦІЛЬОВА ДІЯ — ЛЕГЕНІ**  
Добре проникає  
в легеневу тканину

БРОНХОПНЕВМОНІЯ

ПЛЕВРОПНЕВМОНІЯ

ЕНТЕРОІНФЕКЦІЇ

**1 г / 100 кг**  
2 рази на добу  
× 5 діб



**ТЕЛЯТА**  
віком до 8 тижнів

**ЗБУДНИКИ:** *E. coli*, *Salmonella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Streptococcus spp.*, *Arcanobacterium pyogenes*, *Histophilus somni*, *Mycoplasma spp.*, чутливі до доксицикліну

**1 КГ = КУРС НА 10 ТОНН ЖИВОЇ МАСИ**

**5 діб**  
терапії



**10 000 кг**  
живої маси



**1 кг**  
ДОКСАН-50

**РОЗРАХУНОК НЕОБХІДНОЇ КІЛЬКОСТІ ПИТНОЇ ВОДИ**

доза препарату  
на кг. м.т. на добу (мг)



середня маса тіла  
тварини (кг)



середнє добове споживання води (літри) на одну тварину

кількість препарату  
на літр питної води

Свіжий розчин препарату слід готувати щодня

**Каренція: 14 діб**

**Виробник:**



ТОВ «БІОТЕСТЛАБ»  
тел.: +380 44 245 77 25  
www.biotestlab.ua



**Генеральний дистриб'ютор:**



ТОВ «ТД БІОТЕСТЛАБ»  
тел.: 0 800 213 235  
www.biotestlab.shop