

## АНТИСТРЕС



краплі для перорального застосування, розчин

ОПИС	В'язка опалесциюча рідина, від світло-жовтого до жовтого кольору, з ароматом м'яса.
СКЛАД	1 мл препарату містить діючу речовину: фенібут – 100 мг. Допоміжні речовини: пропіленгліколь, метилпарабен, пропілпарабен, гідроксиетилцелюлоза, ароматизатор, сахароза, сахарин натрію, вода очищена.
ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ	<b>ATC vet класифікаційний код:</b> QN06BX Інші ветеринарні препарати, які виявляють психостимулювальну і ноотропну дії. QN06BX22 Фенібут. Фенібут, що входить до складу препарату, є фенільним похідним ГАМК та фенілєтиламіну. Позитивно впливає на метаболічні процеси в нервових клітинах головного мозку. Фенібут проявляє ноотропну активність, а як похідне ГАМК має анксиолітичну (транквілізуючу) дію. Не впливає на холіно- і адренорецептори. Посилуючи гальмівні ГАМК-ергічні процеси, впливає на функціональній стан за рахунок нормалізації метаболізму та впливу на мозковий кровообіг. Має виражену стрес-коригуючу дію, забезпечує нормалізацію процесів збудження та гальмування в центральній нервовій системі. Препарат швидко всмоктується після перорального введення та добре проникає в усі тканини організму, включаючи гематоенцефалічний бар'єр. 80-95% препарату метаболізується в печінці до неактивних метаболітів. 5% виводиться з організму нирками в незміненому вигляді.
ЗАСТОСУВАННЯ	Препарат АНТИСТРЕС застосовують для зниження збудження та корекції психогенних порушень поведінки у котів і собак при стресах, фобіях, агресії без видимих причин та при підвищенному статевому збудженні (сумісно з контрацептивами), для профілактики захитування.
ДОЗУВАННЯ	Краплі АНТИСТРЕС застосовують котам і собакам перорально на корінь язика 2 рази на добу у дозах: коти – 1 крапля препарату (що еквівалентно 4 мг фенібуту) на 1 кг маси тіла; собаки – 2 краплі препарату (що еквівалентно 8 мг фенібуту) на 1 кг маси тіла. Курс застосування препарату становить 10-15 діб. За наявності ознак сильно-го збудження та психогенних порушень поведінки (агресія, страх, гіперактивність, гіперсексуальна поведінка) курс може бути продовжено до 20-ти діб. При повторному прояві у тварини ознак збудження і/або порушень поведінки – курс застосування препарату повторюють у тих самих дозах, за тією самою схемою. З метою профілактики стресів (транспортування, зміна обстановки, вибухи піротехніки, від'їзд хазяїна, участь у виставках і змаганнях) препарат застосовують за 3-5 діб до майбутнього заходу та протягом 1-4 діб після його закінчення. Для профілактики захитування застосовують одноразово у вищезгаданих дозах за 1-2 години до визначеного початку транспортування тварини. За появи виражених ознак захитування (блювота) прийому препарату мало-ефективний. Для корекції поведінки при підвищенні статевій активності краплі АНТИСТРЕС застосовують у тих самих дозах сумісно з контрацептивами. Тривалість курсу застосування залежить від індивідуальної чутливості тварини і ступеню її збудження.
ПРОТИПОКАЗАННЯ	Індивідуальна чутливість до компонентів препарату (у тому числі в анамнезі), гостра та хронічна ниркова недостатність, діабет. Не застосовувати вагітним та лактуючим самicyям.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ	Перед застосуванням ретельно струсити. <i>Побічна дія</i> При застосуванні препарату згідно з листівкою-вкладкою побічних реакцій не виявлено. При підвищений індивідуальній чутливості до компонентів препарату, можливі прояви збудження, сонливості, дративності, нудоти та алергічні реакції. У таких випадках проводять симптоматичну та десенсибілізуючу терапію. Рідко, при першому введенні препарату, у тварин може спостерігатися сонливість і нудота, які проходять самостійно та не потребують лікування.
ФОРМА ВИПУСКУ	Флакони-крапельниці полімерні по 10, 30 мл, у картонних пачках по 1 шт.
ЗБЕРІГАННЯ	Темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 до 25 °C. При зберіганні допускається випадіння осаду, що легко розбивається при струшуванні. Термін придатності препарату – 2 роки. Після першого відкриття флакону – 28 діб, за умови зберігання його в темному місці за температурі від 5 до 25 °C.

### ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ!

ВЛАСНИК РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ І ВИРОБНИК ГОТОВОГО ПРОДУКТУ	ТОВ «БІОТЕСТЛАБ» 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 57-А, Україна.
---	---