

ФЛОКСИ-СПРЕЙ**спрей для зовнішнього застосування, розчин**

ОПИС	Рідина темно-синього кольору.
СКЛАД	1 мл препарату містить діючу речовину: флуорфенікол - 25 мг. Допоміжні речовини: патентований синій, спирт етиловий, пропілен-гліколь, метилпіролідон, пропан-бутан.
ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ	ATC vet класифікаційний код QD06A – інші антибіотики для місцевого застосування. Флуорфенікол є похідним тіамфеніколу, в якому гідроксильна група замінена атомом фтору, що зумовлює його антибактеріальну активність проти ацетилтрансферазосинтезуючих бактерій. Діє бактериостатично на грампозитивні (<i>Streptococcus spp</i> , <i>Staphylococcus spp.</i>) і грамнегативні (<i>Fusobacterium necrophorum</i> , <i>Bacteroides melaninogenicus</i> , <i>Pasteurella spp.</i> , <i>Salmonella spp.</i> , <i>Proteus spp.</i> , <i>Pseudomonas spp.</i> , <i>Haemophilus spp.</i>) бактерії, а також <i>Mycoplasma spp.</i> , <i>Rickettsia spp.</i> , <i>Chlamydia spp.</i> . Флуорфенікол пригнічує синтез білків у клітинах бактерій. У протоплазмі він зв'язується з 70S-рибосомними субодинаціями, пригнічуючи ферментну активність пептидилтрансферази, гальмуючи, такими чином, синтез білків в рибосомах відповідних бактерій. За зовнішнього застосування флуорфенікол діє місцево і практично не проникає в систему кровообігу.
ЗАСТОСУВАННЯ	Велика рогата худоба, вівці, кози, коні (спортивні), свині, кролі: лікування тварин, з ознаками гнійно-некротичних, інфекційних уражень кінцівок та гострих запальних процесів у ділянці пупкового канатика, для обробки шкіри після хірургічних втручань, а також за травматичних ушкоджень шкіри (рани, тріщини, подрипини, розсісування, укуси, забоях, виразках), дерматитах бактеріального походження, що спричинені мікроорганізмами чутливими до флуорфеніколу.
ДОЗУВАННЯ	Зовнішньо. Перед нанесенням препарату уражену ділянку ретельно очищують від ексудату, некротизованих тканин. Тримавши попередньо струшений флакон на відстані 5-10 см від поверхні пошкодженої ділянки шкіри, натискають на розпилювач 1-2 рази. Застосовувати препарат необхідно через кожні 12 годин. Рекомендований курс лікування – 10 днів. Препарат слід застосовувати до припинення місцевого запального процесу та утворення грануляцій. У випадку, якщо протягом 10-днів не досягнуто терапевтичного ефекту, застосування препарату слід припинити, а схему лікування переглянути.

ПРОТИПОКАЗАННЯ	Не застосовувати тваринам з підвищеною чутливістю до компонентів препарату. Не застосовувати одночасно з засобами для зовнішнього застосування, у складі яких є хлорамфенікол. Не застосовувати коням молоко та м'ясо яких може бути використаним для споживання людьми та вигодовування тварин. Не наносити препарат на вим'я тварин, молоко яких використовується для споживання людьми та вигодовування тварин. Не застосовувати тваринам, молоко яких призначено для споживання людьми.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ	<i>Побічна дія</i> Можливі алергічні реакції (гіперемія шкірного покриву, свербіж) за підвищеної індивідуальної чутливості до компонентів препарату. <i>Особливі застереження при використанні</i> Не допускати попадання препарату в очі тварин та людини. Не дозволяти тварині протягом 5 хвилин злизувати препарат. Перед застосуванням флакон з препаратом необхідно струсити. Застосування препарату має ґрунтуватись на результатах проведення тесту на чутливість мікроорганізмів-збудників захворювання до флуорфеніколу. <i>Використання під час вагітності, лактації, несучості</i> Препарат практично не має системної дії, при вагітності та лактації застосовується без обмежень. <i>Спеціальні застереження</i> Обробку тварин препаратом слід проводити далеко від відкритого вогню та нагрівальних приладів. Не наносити препарат на вим'я тварин, молоко яких використовується для споживання людьми та вигодовування тварин. Не застосовувати аерозоль біля відкритих вогнищ чи інших розжарених речовин. Вогненебезпечний! Уникати попадання прямих сонячних променів та температури, вищої за 45°C. Препарат повинен застосовуватися в добре провітрюваних приміщеннях. <i>Період виведення (каренції)</i> М'ясо – 0 діб. У разі вимушеного забою тварини, оброблені препаратом ділянки необхідно видалити.
ФОРМА ВИПУСКУ	Аерозольний балон по 200,0 мл.
ЗБЕРІГАННЯ	Темне, недоступне для дітей місце за температури від 15°C до 30°C. Не заморозувати! Термін придатності - 2 роки. Термін придатності після першого застосування: до закінчення терміну придатності.
ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ!	
ВЛАСНИК РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ:	ТОВ «БІОТЕСТЛАБ» 08601, Україна, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 57А
ВИРОБНИК ГОТОВОГО ПРОДУКТУ:	ТОВ «БІОТЕСТЛАБ» 08601, Україна, Київська обл., Обухівський район, м. Васильків, вул. Лістового Олександра, 1/3.