

ГЕПАКАРНІТОЛ

Розчин для перорального застосування.

Розчин від світло-жовтого до жовтого кольору.

Допускається опалесценція або осад, що не впливають на якість препарату.

СКЛАД	<p>1,0 мл кормової добавки містить діючі речовини (мг): карнітину гідрохлорид - 25,0 DL-метіонін - 10,0 холіну хлорид - 18,75 магнію сульфат - 10,0 сорбітол - 200,0 цинарин (екстракт артишоку) - 5,0 Допоміжні речовини: пропіленгліколь, калію сорбат, вода очищена.</p>
ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ	<p>ГЕПАКАРНІТОЛ — кормова добавка, що має сукупні фармакологічні властивості окремих складових із вираженою стимулюючою, захисною та жовчогінною дією на печінку, які покращують її функції та метаболізм, оптимізуючи основні фізіологічні процеси.</p> <p>Карнітину гідрохлорид — стимулятор метаболічних процесів, продукт біосинтезу лізину та метіоніну. Застосування його призводить до підвищення витривалості організму, поліпшення функції серця, збільшення м'язової маси за рахунок пришвидшення обмінних процесів у клітинах, покращення проникнення до клітин вітамінів, мінералів та виведення продуктів розпаду, зменшення ризику виникнення жирової дистрофії печінки.</p> <p>ГЕПАКАРНІТОЛ поєднує позитивні властивості метіоніну та холін хлориду для синтезу ферментів печінки, що важливо при детоксикації аміаку, підвищенні ефективності роботи печінки, регенерації пошкоджених тканин.</p> <p>Завдяки екстракту артишоку та сорбітолу ГЕПАКАРНІТОЛ має холеретичну (збільшення кількості жовчі) та жовчогінну (стимулювання скорочення жовчного міхура) дії.</p>
ЗАСТОСУВАННЯ	<p>Для детоксикації печінки, пришвидшення її відновлення у періоди інтенсивного перевантаження (кормовими мікотоксинами, аміаком, ожирінням тощо), покращення продуктивності тварин і птиці.</p> <p>ГЕПАКАРНІТОЛ згодують для поліпшення процесів метаболізму в печінці, з метою уникнення негативних наслідків медикаментозного лікування, токсикозів, зниження кількості споживання корму, при погіршенні індексу репродукції, підвищенні сприйнятливості до хвороб, високої смертності від печінкової недостатності.</p>
ДОЗУВАННЯ	<p>Велика рогата худоба, кури, індики, свині: кормову добавку впродовж 5 днів застосовують перорально, змішуючи з питною водою, із розрахунку: 0,5-1 мл кормової добавки на 1 л питної води на добу.</p>

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ	Слід дотримуватися загальноприйнятих правил особистої гігієни та техніки безпеки, які передбачені при роботі з кормовими добавками. Невикористаний продукт або його залишки мають бути утилізовані згідно чинних вимог.
ФОРМА ВИПУСКУ	Флакони з темного скла по 10 мл та пластикові флакони із ПЕВТ вмістом на 1, 5 і 10 л, пластикові каністри із ПЕВТ вмістом на 25, 220 і 1000 л.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУ- ВАННЯ	Зберігати в сухому темному, недосяжному для дітей місці у пакуванні виробника за температури від 5° до 25 °С
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	36 місяців. Після розведення у питній воді — 24 години.
ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ!	
ВЛАСНИК РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ:	МПА Ветеринарі Медісінс енд Едітівс С.Л.С., Могода, 16-18 Полігон Індастріал Кан Сальвателла 08210 Барбера дель Валлес, Барселона, Іспанія.
ВИРОБНИК ГОТОВОГО ПРОДУКТУ:	МПА Ветеринарі Медісінс енд Едітівс С.Л.С. Могода, 16-18 -Полігон Індастріал Кан Сальвателла 08210 Барбера дель Валлес, Барселона, Іспанія. Виробник: ТОВ «БІОТЕСТЛАБ», 08600, Україна, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, б. 57-А. Тел.: +380 44 245-77-25, www.biotestlab.ua