Листівка-вкладка
ТУ У 21.2-38692696-001:2025

UA

КРИШТАЛЕВИЙ ПОГЛЯД

краплі очні

ОПИС	Прозорий розчин.
СКЛАД	1 мл препарату містить діючі речовини: хлоргексидину біглюконат – 0,15 мг; таурин – 20 мг; гліцерин – 10 мг; бурштинова кислота – 1 мг. Допоміжна речовина: вода для ін'єкцій.
ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ	Препарат містить в своєму складі хлоргексидину біглюконат, таурин, гліцерин і бурштинову кислоту. Краплі очні «Кришталевий погляд» мають бактерицидні, протизапальні та протинабрякові властивості. При закапуванні в кон'юнктивальну порожнину препарат легко проникає в усі тканини ока, забезпечуючи стійкий терапевтичний рівень активних компонентів. Хлоргексидин чинить швидку бактерицидну дію на грампозитивні та грамнегативні бактерії, дерматофіти й ліпофільні віруси. В результаті дисоціації солей хлоргексидину, катіони, що утворюються, зв'язуються зі стінками бактеріальних клітин. Це порушує осмотичну рівновагу та мембранну функцію клітин, що призводить до зниження рівня клітинного АТФ та загибелі мікроорганізму. Таурин захищає сітківку від пошкоджень, покращує функцію фоторецепторів, стабілізує клітинні мембрани та покращує нервову провідність зорового нерва. Гліцерин добре зволожує кон'юнктиву ока. Бурштинова кислота нормалізує окисно-відновні процеси, чинить репаративну дію, зменшує запалення, уповільнює розвиток катаракти і профілактує дегенеративні й дистрофічні порушення в сітківці та кришталику ока.
ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ	Собакам і котам для повсякденної гігієнічної обробки очей (видалення засохлого ексудату з куточків очей). Також для зменшення пігментації внаслідок підтікання сліз протирати поверхню навколо очей щоденно.
ДОЗИ ТА СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ	Для повсякденного догляду за очима, при кон'юнктивітах легкого ступеня стерильним марлевим тампоном, змоченим препаратом, видаляють з внутрішнього кута ока тварини ексудат і скоринки, після чого препарат закапують у кон'юнктивальну порожнину котам і собакам масою до 10 кг по 1 краплі, собакам масою понад 10 кг – по 2 краплі. Обробку проводять 1-3 рази на день, у разі потреби, з 5-10-денними інтервалами: • при обробці очей 1 раз на день препарат застосовують не більше 45 днів, після чого роблять 10-денну перерву; • при обробці очей 2 рази на день препарат застосовують не більше 20 днів, після чого роблять 7-денну перерву; • при обробці очей 3 рази на день препарат застосовують не більше 14 днів, після чого роблять 5-денну перерву.

ДОЗИ ТА СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ	При надмірній сльозотечі, почервонінні, травмах, потраплянні сторонніх предметів або подразнюючих речовин препарат закапують по 1-2 краплі 3 рази на день протягом 5-14 днів. З метою профілактики катаракти і вікових дегенеративних змін сітківки та рогівки ока препарат застосовують по 1-2 краплі 2 рази на день курсами по 20 днів з 10-денним інтервалом.
ПРОТИПОКАЗАННЯ	Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Краплі не призначені для застосування продуктивним тваринам.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ	*Побічні явища* При застосуванні препарату згідно з інструкцією побічних явищ і ускладнень не спостерігається. За підвищеної індивідуальної чутливості тварини до компонентів препарату та у разі прояву алергічних реакцій (продовжується чи збільшується кон'юнктивальна гіперемія) використання препарату припиняється і проводиться десенсибілізуюча терапія. *Особливі застереження при використанні* Слід уникати порушень схеми застосування, через те, що це може призвести до зниження терапевтичного ефекту. У разі пропуску чергової обробки, препарат слід застосувати якомога швидше в передбаченій цією інструкцією дозі. *Застосування під час вагітності, лактації* Нешкідливість застосування ветеринарного лікарського засобу вагітним та новонародженим тваринам не встановлена. Можливе застосування препарату тваринам в період лактації. Використання препарату у період вагітності чи лактації повинно базуватись на оцінці користі/ризику відповідальним лікарем ветеринарної медицини в кожному конкретному випадку. *Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії* При спільному застосуванні з іншими офтальмологічними лікарськими засобами інтервал між їх застосуванням має становити не менше 5 хвилин. Відомості про сумісність з лікарськими препаратами інших фармакологічних груп чи кормових добавок відсутні.
ЗБЕРІГАННЯ	У закритому заводському пакуванні, з пересторогою, в захищеному від прямих сонячних променів місці, недоступному для дітей, за температури від 5 до 25°С. Термін придатності – 2 роки. Зберігання після відкриття флакону – 28 діб за температури не вище 8°С.
ФОРМА ВИПУСКУ	Полімерний флакон-крапельниця по 10, 30 мл. Зовнішнє пакування – картонна коробка.
ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ!	
ВЛАСНИК РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ	ТОВ «БІОТЕСТЛАБ» Україна 08601, Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, 57-А
ВИРОБНИК ГОТОВОГО ПРОДУКТУ:	ТОВ «БІОТЕСТЛАБ» Україна 08601, Київська область, Обухівський район, м. Васильків, вул. Лістрового Олександра, 1/3 www.biotestlab.ua