

ЕНРОКСАН МАКС	
суспензія для ін'єкцій	
ОПИС	Суспензія від світло-жовтого до жовтого кольору.
СКЛАД	1 мл препарату містить діючу речовину: енрофлоксацин – 100 мг. Допоміжні речовини: спирт бензиловий, бутилгідрокси-толуол, бутилгідроксианізол, пропіленгліколь дікаприлат/дікапрат.
ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ	АТС vet класифікаційний код QJ01 – антибактеріальні ветеринарні препарати для системного застосування. QJ01MA90 – Енрофлоксацин. Енрофлоксацин належить до хімічного класу фторхінолонів. Він пригнічує синтез бактеріальної ДНК-гірази в ядрах клітин мікроорганізмів. Енрофлоксацин діє бактерицидно проти грампозитивних (<i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Streptococcus spp.</i>, <i>Clostridium perfringens</i>, <i>Corynebacterium pyogenes</i>) та грамнегативних мікроорганізмів (<i>Enterobacteriaceae</i>, включно <i>Salmonella spp.</i>, <i>Pasteurella spp.</i>, <i>Escherichia coli</i>, <i>Klebsiella spp.</i>, <i>Proteus spp.</i>, <i>Haemophilus spp.</i>, <i>Actinobacillus spp.</i>, <i>Brucella spp.</i>, <i>Bordetella bronchiseptica</i>, <i>Pseudomonas aeruginosa</i>, <i>Pasteurella spp.</i>, та інші), а також діє проти мікоплазм (<i>Mycoplasma spp.</i>) та хламідій (<i>Chlamydia spp.</i>). Після підшкірного та внутрішньом'язового введення енрофлоксацин дуже швидко абсорбується завдяки високій біодоступності. Його максимальна концентрація в крові досягається у середньому через 6 год., терапевтична концентрація підтримується протягом 2-х діб. Енрофлоксацин частково метаболізується в печінці і виводиться з організму з сечею і жовчю. Енрофлоксацин має високий рівень розподілу. Так, його концентрації в тканинах та органах зазвичай значно вищі ніж у сироватці крові. Органи, в яких може спостерігатися найбільша концентрація, це – легені, печінка, нирки, шкіра, кістки та лімфатична система.
ЗАСТОСУВАННЯ	Велика рогата худоба: лікування тварин при захворюваннях органів дихання, що спричинені <i>Mannheimia haemolytica</i>, <i>Escherichia coli</i>, <i>Pasteurella multocida</i>, <i>Haemophilus somni</i> та <i>Mycoplasma spp.</i> та іншими збудниками чутливими до енрофлоксацину. Свині: лікування тварин, хворих на синдром мастит-метрит-агалактія, а також при захворюваннях органів дихання, які спричинені <i>Mycoplasma hyopneumoniae</i>, <i>Pasteurella multocida</i>, <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i>, <i>Haemophilus somni</i>, <i>Streptococcus suis</i>, <i>Bordetella bronchiseptica</i>, чутливими до енрофлоксацину.
ДОЗУВАННЯ	Великій рогатій худобі: підшкірно одноразово, в дозі 7,5 мл на 100 кг маси тварини (7,5 мг енрофлоксацину на 1 кг маси тварини). Свиням: внутрішньом'язово в дозі 7,5 мл на 100 кг маси тварини (7,5 мг енрофлоксацину на 1 кг маси тварини) одноразово. В одне місце ін'єкції можна вводити не більше 15 мл для великої рогатої худоби, 5 мл - для свиней.

ПРОТИПОКАЗАННЯ	Не застосовувати тваринам із індивідуальною чутливістю до складових препарату. Не застосовувати для нецільових тварин. Не застосовувати тваринам із порушенням розвитку хрящової та кісткової тканин, а також з ознаками захворювань центральної нервової системи та нирковою недостатністю. Не застосовувати одночасно з нестероїдними протизапальними засобами, антибіотиками групи макролідів, тетрациклінами та хлорамфеніколом, що містять катіони Fe^{3+}, Ca^{2+}, Al^{+3} і Mg^{2+}, ненасиченими жирними кислотами та поліфосфатами. Не застосовувати для профілактики. Не застосовувати при виявленні стійких штамів патогенних бактерій, резистентних до хінолонів.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ	<i>Побічна дія</i> При застосуванні за показаннями у рекомендованих дозах побічних явищ та ускладнень, як правило, не спостерігається. Фторхінолони можуть викликати атропатії і кульгавість у молодих тварин, яка виникає внаслідок пошкодження суглобових хрящів. У місці ін'єкції може виникнути незначна припухлість, яка не потребує лікування. <i>Особливі застереження при використанні</i> По можливості, фторхінолони слід застосовувати з врахуванням чутливості мікроорганізмів. Застосування препарату з порушенням рекомендацій, наведених в цій листівці, може призвести до збільшення кількості бактерій, резистентних до фторхінолонів, та зменшення ефективності лікування іншими фторхінолонами через наявність перехресної резистентності. <i>Спеціальні застереження</i> Перед застосуванням флакон з препаратом необхідно ретельно струсити. <i>Період виведення (каренції)</i> Забій тварин на м'ясо дозволяють через 14 діб (велика рогата худоба), та 5 діб (свині) після останнього застосування препарату. Споживання молока дозволяють через 4 дні після останнього застосування препарату. Отримане, до зазначеного терміну, м'ясо та молоко утилізують або згодовують непродуктивним тваринам, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини.
ФОРМА ВИПУСКУ	Флакони зі скла, закриті гумовими корками під алюмінієву обкату по 10, 50, 100 мл.
ЗБЕРІГАННЯ	Темне, недоступне для дітей місце за температури від 5 °C до 25 °C. Термін придатності препарату – 2 роки. Після першого відбору з флакону – 28 діб за умови зберігання його у темному місці за температури від 5 °C до 25 °C.
ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ!	
ВЛАСНИК РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ	ТОВ «БІОТЕСТЛАБ» Україна, 08601, Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, 57А
ВИРОБНИК ГОТОВОГО ПРОДУКТУ	ТОВ «БІОТЕСТЛАБ» Україна, 08601, Київська область, Обухівський район, м. Васильків, вул. Лістрогого Олександра, 1/3 www.biotestlab.ua