

СТИМУЛ							
розчин для ін'єкцій							
ОПИС		Прозорий розчин від червоного до червоного з малиновим або рожевим відтінком кольору, без видимих механічних включень.					
СКЛАД		1 мл препарату містить активної речовини: натрію нуклеїнат – 1 мг. Допоміжні речовини: комплекс біологічно активних речовин (Середовище 199), натрію гідрокарбонат, метилпарабен, пропілпарабен, пропіленгліколь, вода для ін'єкцій.					
ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ		ATC-vet класифікаційний код: QL03 Імуностимулятори. Препарат має адаптогенну, імуностимулюючу, загальнотонізуючу дію; покращує обмін речовин, клітинний обмін, регенерацію тканин, завдяки наявності у складі препарату натрію нуклеїнату та збалансованого комплексу мінеральних речовин, амінокислот та вітамінів. <i>Натрію нуклеїнат</i> є індуктором лейкоцитарної реакції, стимулятором внутрішньоклітинного метаболізму, нуклеїнового обміну в організмі тварин, особливо за послабленого імунітету. Має проти-запальну активність, пригнічує підвищену агрегацію тромбоцитів. В основі фармакотерапевтичних ефектів натрію нуклеїнату лежать такі механізми: стимулювання процесів клітинного метаболізму, посилення біосинтезу ендогенних нуклеїнових кислот, специфічних протеїнів та ферментів; посилення мітотичної активності клітин кісткового мозку, прискорення процесів регенерації; підвищення енергозабезпечення клітини шляхом стимулювання синтезу макроергічних сполук, таких як АТФ; нормалізація NO-синтазної активності, інгібування окисних процесів у клітинних мембранах, стабілізація мембран клітин та оптимізація окисно-відновних процесів у тканинах; підвищення продукції інтерферону та стимулювання противірусного захисту; активація гіпофізарно-наднирково-залозної системи зі збільшенням рівня ендогенних глюкокортикоїдів.					
ЗАСТОСУВАННЯ		Препарат застосовують як тонізуючий засіб у комплексі терапевтичних заходів при лікуванні великої рогатої худоби, коней, свиней, хутрових звірів, собак, котів, свійської птиці (курчат, курей несучок). Застосовують при анеміях, гіповітамінозах, інфекційних та інвазійних захворюваннях, при захворюваннях репродуктивної системи, для стимуляції охоти, а також, при отруєннях, у післяопераційний період; з профілактичною метою, як загальнозміцнюючий засіб, під час підготовки тварин до виставок, змагань і транспортування. Застосовують молодняку для покращення росту та розвитку, та виснаженим та ослабленим тваринам.					
ДОЗУВАННЯ		При лікуванні та профілактиці великої рогатої худоби, коней, свиней препарат вводять підшкірно, внутрішньом'язово, внутрішньовенно. Можливе пероральне застосування із питною водою.					
Таблиця 1. Дозування при лікуванні та профілактиці великої рогатої худоби, коней, свиней.							
Вікова група		Вид обробки		Доза препарату		Курс лікування	
Молодняк		Профілактика		0,5-5,0 мл/голову		1-2 рази інтервалом 24-48 годин	
		Лікування		3,0-10,0 мл/голову		2-5 разів з інтервалом 24-48 годин	
Дорослі тварини		Профілактика		3,0-5,0 мл/100 кг м.т.		1-2 рази з інтервалом 24-48 годин	
		Лікування		5,0-10,0 мл/100 кг м.т.		2-5 разів з інтервалом 24-48 годин	

ДОЗУВАННЯ	Свійській птиці препарат застосовують перорально з питною водою.		
	Таблиця 2. Дозування препарату при застосуванні свійській птиці		
	Призначення	Доза препарату	Курс введення
	Курям-несучкам для підвищення несучості та збільшення маси яєць	Перорально з питною водою, 5 - 50 мл/л води	Робочим розчином заповнюють поїлку з розрахунку 2-х годинної потреби у воді. Випоюють впродовж 2-х годин 1 раз на добу 4-5 дів поспіль. Перед випоюванням препарат птицю витримують без води протягом 1 години.
	Для збереженості добо-вих курчат		
	Для підвищення приростів маси тіла курчат-бройлерів		
	При лікуванні та профілактиці собак, котів, хутрових звірів препарат вводять підшкірно або внутрішньовенно.		
	Таблиця 3. Дозування препарату при лікуванні та профілактиці собак, котів, хутрових звірів		
	Призначення	Доза препарату	Курс лікування
	При інтоксикації, отруєннях, бактеріальних та вірусних захворюваннях, у післяопераційний період	0,5 – 1,0 мл/кг м. т.	7 - 10 разів з інтервалом 24 години
	При дегельмінтизації		Дворазово, за добу перед обробкою, та повторно через добу після обробки
	В період вагітності для покращення стану та розвитку ембріонів		На початку першого та другого місяців вагітності, курсами по 10 ін'єкцій з інтервалом 24 години
	В період лактації для покращення якості молока		10 ін'єкцій з інтервалом 24 години одразу після пологів
	Для покращення росту та розвитку молодняка		Курсами по 5 ін'єкцій з інтервалом 24 години, починаючи з другого місяця життя. Курси можна повторювати щомісячно до 6-ти місячного віку
	Для покращення обмінних процесів		Курсами по 10 ін'єкцій з інтервалом 24 години. Курси можна повторювати один раз на 3 місяці
	З профілактичною метою під час підготовки тварин до виставок, змагань і транспортування		3 ін'єкції з інтервалом 24 години за 3 доби перед запланованою подією
ПРОТИПОКАЗАННЯ	Підвищена чутливість до компонентів препарату.		
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ	Побічна дія Немає. Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії Несумісність з іншими лікарськими препаратами, кормами та кормовими добавками невідома.		
ФОРМА ВИПУСКУ	Флакони зі скла або полімерних матеріалів по 10, 50, 100, 200, 250 мл.		
ЗБЕРІГАННЯ	Темне, недоступне для дітей місце при температурі від 2 до 8°C. Термін придатності препарату – 18 місяців. Після першого відбору з флакону – 7 дів за умови зберігання в сухому темному місці при температурі від 2 до 8°C.		
ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ!			
ВЛАСНИК РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ	ТОВ «БІОТЕСТЛАБ» вул. Володимирська, 57А, м. Васильків, Київська область, 08601, Україна		
ВИРОБНИК ГОТОВОГО ПРОДУКТУ	ТОВ «БІОТЕСТЛАБ» вул. Лістового Олександра, 1/3, м. Васильків, Обухівський район, Київська область, 08601, Україна www.biotestlab.ua		
🐾🐾🐾 BioTestLab			