

ПЕДІСАН			
розчин для зовнішнього застосування			
ОПИС	Прозора рідина зеленого кольору зі специфічним запахом.		
СКЛАД	100 мл препарату містять діючі речовини: бензалконію хлорид – 20,0 г; глутаровий альдегід – 10,0 г. Допоміжні речовини: сульфат міді, сульфат алюмінію, полівінілпіролідон, трилон Б, синтанол, поліетилен-гліколь, вода очищена.		
ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ	АТС – <i>vet класифікаційний код: QD08 - Антисептики та дезінфектанти.</i> ПЕДІСАН – комплексний препарат для санації копитного рога, діє антисептично (включаючи <i>Fusobacterium necrophorum</i> , <i>Bacteroides nodosus</i> , <i>Clostridium perfringes</i> та ін.). Алкілдіметилбензиламонію хлорид та глутараровий альдегід проявляють бактерицидну (<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Streptococcus faecalis</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>E. coli</i> , <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Proteus mirabilis</i> , <i>Listeria monocytogenes</i> , <i>Mycoplasma spp.</i>), фунгіцидну (<i>Candida spp.</i> , <i>Aspergillus spp.</i> , <i>Fusarium spp.</i> , <i>Penicillium spp.</i>), віруцидну (<i>Newcastle disease virus</i> , <i>Reovirus</i> , <i>Rotavirus</i> , <i>Coronavirus</i> , <i>Paramyxovirus</i> , <i>Poxvirus</i> , <i>Orthomyxovirus</i> , <i>Pestivirus</i>) дії.		
ЗАСТОСУВАННЯ	Препарат призначений для гігієнічної обробки копит тварин та для догляду за копитним рогом.		
ДОЗУВАННЯ	Засіб застосовують методом лікувальних ванн шляхом занурення копит у робочі розчини препарату або методом зрошення. Робочі розчини препарату готують у промаркованих ємностях із будь-яких матеріалів шляхом розведення засобу водою кімнатної температури. Для профілактики захворювань копитного рога використовують 2,5-5% розчин препарату впродовж 7 днів один раз на місяць. У залежності від кількості корів, ванни заповнюють розчином препарату згідно таблиці 1.		
	Кількість тварин	Концентрація робочого розчину	Застосування
	до 50 корів	2,5%	Розчин потрібно замінювати кожні 2 доби
	50-200 корів	5%	Розчин потрібно замінювати кожні 2 доби
	200-1000 корів	5%	Розчин потрібно замінювати щодобово
	Для тварин із незначними ураженнями кінцівок (при видаленні уражених ділянок, зрізанні некротичних тканин) використовують 10% розчин препарату методом зрошення дворазово з інтервалом 24 години. Потім переходять до обробки кінцівок 5% розчином препарату методом занурення. Обробку проводять через добу, не менше трьох разів.		

ДОЗУВАННЯ	При значних дефектах тканин, що потребували глибокої розчистки застосовують метод локальних аплікацій у вигляді пов'язок, змочених у 10% робочому розчині засобу. Поновлення аплікацій та санацію ділянки проводять через добу, не менше трьох разів. Після цього для профілактики вторинного інфікування переходять до загальної обробки кінцівок 5% розчином засобу методом занурення. Обробку у ваннах проводять через добу, не менше трьох разів.
ПРОТИПОКА-ЗАННЯ	Не встановлені.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ	З метою запобігання хімічних опіків шкіри, утворення виразок та ерозій потрібно заповнювати ванни розчином препарату не вище рогового шару копит.
СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ОСІБ І ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ	До роботи із засобом не допускають осіб, молодших за 18 років. Роботи, пов'язані із приготуванням робочих розчинів препарату, проводять із дотриманням заходів щодо захисту органів дихання, шкіри та очей (спецодяг, універсальний респиратор, захисні окуляри, гумові рукавиці). Приготування робочих розчинів проводять у провітрюваному приміщенні, де є вода. При появі ознак подразнення органів дихання необхідно припинити роботу із засобом, постраждалого негайно вивести на свіже повітря або в інше приміщення. Рот і носоглотку прополоскати водою, звернутись до лікаря. При випадковому попаданні засобу в очі необхідно терміново промити їх проточною водою протягом 10-15 хвилин та звернутися до лікаря. У разі випадкового попадання препарату на шкіру потрібно ретельно промити уражену ділянку проточною водою, після цього змастити шкіру пом'якшуючим кремом. При випадковому попаданні засобу в шлунок необхідно дати випити постраждалому декілька склянок води з 15-20 подрібненими таблетками активованого вугілля та звернутись до лікаря. Всі електричні прилади при обробці повинні бути відключені. Забороняється палити, пити, приймати їжу під час виконання робіт з препаратом. Після закінчення роботи обличчя і руки слід вимити водою з милом.
ФОРМА ВИПУСКУ	Флакони і каністри з полімерних матеріалів по 100 або 500 мл, 1, 5, 10, 20 та 25 л.
ЗБЕРІГАННЯ	Зберігати в тарі виробника за температури від 5 до 25 °C у сухих темних, вентильованих, недоступних для дітей складських приміщеннях. Не заморожувати! Термін придатності - 2 роки.

ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ!

ВЛАСНИК РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ	ТОВ «БІОТЕСТЛАБ» Україна, 08601, Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, 57А
ВИРОБНИК ГОТОВОГО ПРОДУКТУ	ТОВ «БІОТЕСТЛАБ» Україна, 08601, Київська область, Обухівський район, м. Васильків, вул. Лістрового Олександра, 1/3, www.biotestlab.ua