

SUIMUN TESCHEN, СУИМУН ТЕШЕН**вакцина проти хвороби Тешена, інактивована**

СКЛАД	В 1,0 мл вакцини міститься вірус хвороби Тешена, штам «Закарпатський» $\geq 8,2$ lg ТЦД ₅₀ до інактивації
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА	Емульсія.
ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ	Вакцина забезпечує захист щепленого поголів'я від захворювання на хворобу Тешена. Імунітет у щеплених тварин формується впродовж 2-х тижнів після вакцинації та зберігається до 11 місяців.
ВИД ТВАРИН	Свині.
ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ	Профілактика захворювання свиней на хворобу Тешена. Лікувальних властивостей не має.
ПРОТИПОКАЗАННЯ	Не вакцинувати виснажених і хворих свиней.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ	Не використовують вакцину з флаконів з тріщинами, без етикеток, порушенням закупорювання, зміною кольору та консистенції вмісту, а також вакцину, не використану впродовж 3-х годин з моменту першого відбору з флакону або заморожену. Допускається розшарування вакцини на олійну та водну фракції у верхній частині флакону, що зникає при збовтуванні.
ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЗАСОБАМИ	В разі необхідності дегельмінтизацію проводять за два тижні до вакцинації свиней або через два тижні після неї.
ОСОБЛИВІ ВКАЗІВКИ ПРИ ВАГІТНОСТІ, ЛАКТАЦІЇ	Для уникнення абортів внаслідок стресу не рекомендується вакцинувати поросних свиноматок за сім днів до опоросу. При лактації застосовують без обмежень. При загрозі виникнення захворювання свиноматок вакцинують незалежно від строку поросності та лактації.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ	Вакцину вводять внутрішньом'язово в ділянку шиї або внутрішньої поверхні стегна порослятам віком до 60 днів у дозі 1,0 мл, свиням старшого віку – 2,0 мл. Порослят, що вакциновані до 2-х місячного віку, ревакцинують у 3-х місячному віці в дозі 2,0 мл. В подальшому всіх свиней одноразово вакцинують з інтервалом 10 місяців. У разі виникнення загрози раннього інфікування всіх тварин вакцинують одночасно, незалежно від віку та термінів попередньої вакцинації.
ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ	Щеплення може супроводжуватися алергічною реакцією в місці введення вакцини. Впродовж перших трьох днів можливе підвищення температури тіла до одного градуса. У неблагополучних пунктах (господарствах) після імунізації можлива загибель тварин, які раніше були інфіковані епізоотичним вірусом хвороби Тешена.

ПЕРЕДОЗУВАННЯ (СИМПТОМИ, НЕВІДКЛАДНІ ЗАХОДИ)	Нешкідлива для свиней при введенні двох доз вакцини.
ПЕРІОД ОЧІКУВАННЯ	Нуль діб.
СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ОСІБ І ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬ ВІП	Цей ветеринарний препарат містить мінеральну олію. Випадкова ін'єкція/самоін'єкція може призвести до сильного болю та набряку, особливо, якщо це сталося у суглоб або палець. При випадковому введенні вакцини, негайно зверніться за медичною допомогою та візьміть з собою листівку-вкладку. Якщо біль триває більше 12 годин після медичного огляду, зверніться до лікаря ще раз.
ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З НЕВИКОРИСТАНИМ ВІП, СПОСОБИ ЙОГО ЗНЕШКОДЖЕННЯ І УТИЛІЗАЦІЇ	Невикористану вакцину із закінченим терміном придатності, голки, шприці та флакони з залишками вакцини знезаражують кип'ятінням впродовж 15 хвилин.
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	24 місяці. Після першого відбору вакцину використати впродовж 3-х годин.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ	В темному, недоступному для дітей місці за температури від 2 до 8 °С. Не заморожувати!
УПАКОВКА ТА ФАСУВАННЯ	Флакони зі скла або пластику по 4,0 мл або 10,0 мл вакцини, закупорені гумовими пробками та обкатані алюмінієвими ковпачками.
НАЗВА ТА МІС- ЦЕЗНАХОДЖЕН- НЯ ВИРОБНИКА ТА ВЛАСНИКА РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ	ТОВ «БІОТЕСТЛАБ», 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 57-А Адреса виробництва: 03143 м. Київ, вул. Академіка Лебедєва, 1; 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Лістового Олександра, буд. 1/3.
ПРАВИЛА ВІДПУСКУ	За рецептом.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ	Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.