

POLIMUN ND IB EDS, ПОЛІМУН НХ ІБК СЗН

Вакцина проти Ньюкаслської хвороби, інфекційного бронхіту та синдрому зниження несучості курей, інактивована.

Склад	Активні діючі речовини в 1 дозі (0,5 мл): Антиген вірусу Ньюкаслської хвороби штаму «Ла-Сота» ДК-124, інактивований $\geq 4,0 \log_2$ HI* Антиген вірусу інфекційного бронхіту курей штаму Чапаєвський (М-41), інактивований $\geq 4,0 \log_2$ HI* Антиген вірусу синдрому зниження несучості штаму ССЯ-76, інактивований $\geq 4,0 \log_2$ HI* * HI – титр специфічних антитіл визначений в РЗГА, що індукується інактивованими антигенами.
Фармацевтична форма	Емульсія.
Імунобіологічні властивості	Вакцина у домашньої птиці з 28-ї доби стимулює формування специфічного імунітету проти захворювання на Ньюкаслську хворобу, інфекційний бронхіт та синдром зниження несучості курей, що триває до 60-го тижня життя. Лікувальних властивостей не має.
Вид птиці	Кури.
Показання до застосування	Для профілактики захворювання на Ньюкаслську хворобу, інфекційний бронхіт та синдром зниження несучості курей.
Протипоказання	Забороняється вакцинувати птицю: – в інкубаційному періоді інфекційного захворювання; – у стані виснаження; – уражену гельмінтами; – у стресовому стані, викликаному транспортуванням, впливом зовнішнього середовища, або в іншому імуносупресивному стані. Напруженість імунітету може бути недостатньою у випадках, якщо вакцина була застосована не відповідно до листівки вкладки.
Застереження при застосуванні	Перед використанням вакцину підігрівають до температури 20-25 °C, флакони ретельно струшують. При вакцинації необхідно дотримуватись правил асептики та особистої безпеки. Дозволяється використовувати вакцину з незначним розшаруванням у верхній частині флакону, що зникає при струшуванні.
Взаємодія з іншими засобами	Не змішувати з іншими лікарськими та профілактичними препаратами.
Особливі вказівки при несучості	Не вакцинують птицю в період несучості.
Спосіб застосування та дози	Вакцину вводять по 0,5 мл внутрішньом'язово (у ділянку стегна або грудних м'язів) або підшкірно (в нижню ділянку шиї) курям 90-100-денного віку, але не пізніше ніж за 30 днів до початку періоду несучості.

Побічні ефекти	Відсутні за умови дотримання вимог листівки-вкладки.
Період виведення (каренції)	Нуль діб.
Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВІП	Флакони з вакциною перед застосуванням підігрівають до кімнатної температури та ретельно струшують. Не використовують вакцину з флаконів з тріщинами, без етикеток, порушеним закупорюванням, заморожену, невикористану впродовж 10 годин з моменту першого відбору або з закінченим терміном придатності.
Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження і утилізації	Невикористану вакцину протягом 10 годин після першого відбору, вакцину з закінченим терміном дії, порожні флакони, шприці та флакони з залишками вакцини знезаражують кип'ятінням впродовж 15 хвилин.
Термін придатності	24 місяці. Вакцину після першого відбору препарату з флакону необхідно використати впродовж 10 годин.
Умови зберігання і транспортування	В темному, недоступному для дітей місці за температури від 2 до 8 °С. Не заморозувати!
Упаковка	Флакони з пластику або скла по 200, 500 або 1000 доз вакцини закриті гумовими пробками та закатані алюмінієвими ковпачками.
Назва, місцезнаходження і місце здійснення діяльності	ТОВ „БІОТЕСТЛАБ” 08601, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 57-А. Адреса виробництва: 08601, Київська обл., м. Васильків, вул. Лістового Олександра, буд. 1/3.
Правила відпуску	За рецептом.
Додаткова інформація	Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з пошланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до “Вказівки про порядок пред’явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині” від 03.06.98 № 2, три незкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.