

POLIMUN SALMO, ПОЛІМУН САЛЬМО**вакцина проти сальмонельозу птиці, полівалентна, інактивована.**

СКЛАД	До інактивації в дозі (0,5 мл (ml)): <i>Salmonella enteritidis</i> штамм SE-15 не менше 10 ⁸ КУО <i>Salmonella typhimurium</i> штамм ST-15 не менше 10 ⁸ КУО <i>Salmonella gallinarum</i> штамм SG-15 не менше 10 ⁸ КУО
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА	Емульсія.
ІМУНОБІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ	Стимулює формування активного імунітету проти <i>Salmonella enteritidis</i> , <i>Salmonella typhimurium</i> , <i>Salmonella gallinarum</i> . Стійкий імунітет формується у птиці через 4 тижні після ревакцинації і триває до 57-60 тижня життя.
ВИД ТВАРИН	Кури.
ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ	Для профілактичної вакцинації племінних бройлерів, племінної яєчної та яєчної птиці проти сальмонельозу, викликаного <i>Salmonella enteritidis</i> , <i>Salmonella typhimurium</i> , <i>Salmonella gallinarum</i> . Лікувальних властивостей не має.
ПРОТИПОКАЗАННЯ.	Не дозволяється вакцинувати курей у стані виснаження та клінічно хворих.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ	Перед використанням вакцину підігривають до температури 20-25°C, флакони ретельно струшують. При вакцинації необхідно дотримуватись правил асептики та особистої безпеки. Дозволяється використовувати вакцину з незначним розшаруванням у верхній частині флакону, що зникає при струшуванні.
ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЗАСОБАМИ	Не вивчалась. Не рекомендується змішувати з іншими лікувальними та профілактичними засобами.
ОСОБЛИВІ ВКАЗІВКИ ПРИ НЕСУЧОСТІ	Вакцина не впливає на несучість, заплідненість та інкубацію яєць.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ	Вакцину застосовують у дозі 0,5 мл внутрішньом'язово в ділянку грудних м'язів або шляхом підшкірних ін'єкцій в ділянку нижньої частини шиї або між крилами. Племінних бройлерів бажано вакцинувати у 9-12-тижневому віці, повторно у віці 17-20 тижнів. Племінну яєчну та яєчну птицю вакцинують у 9-12-тижневому віці, повторно у віці 13-17 тижнів. Мінімальний інтервал між вакцинаціями має становити не менше, ніж 4 тижні. Повторна вакцинація проводиться не пізніше, ніж за 3 тижні до початку несучості.

ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ	У місцях введення вакцини можлива місцева реакція у вигляді припухлості розміром 5-10 мм, яка зникає сама по собі протягом 2-3 тижнів.
ПЕРЕДОЗУВАННЯ	Введення двох доз вакцини не впливає негативно на птицю.
ПЕРІОД ВИВЕДЕННЯ (КАРЕНЦІЇ)	Нуль діб.
СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ОСІБ І ОБСЛУГОВУЮЧОГО ПЕРСОНАЛУ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬ ВІП	Цей ветеринарний препарат містить мінеральну олію. Випадкова ін'єкція/самоін'єкція може призвести до сильного болю та набряку, особливо, якщо це сталося у суглоб або палець. При випадковому введенні вакцини, негайно зверніться за медичною допомогою та візьміть з собою листівку-вкладку.
ОСОБЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПОВОДЖЕННІ З НЕВИКОРИСТАНИМ ВІП, СПОСОБИ ЙОГО ЗНЕШКОДЖЕННЯ І УТИЛІЗАЦІЇ	Вакцину із закінченим терміном придатності, порожні флакони, шприці та флакони з залишками вакцини знешкоджують кип'ятінням впродовж 15 хвилин.
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	18 місяців. Вакцину після першого відбору препарату з флакону необхідно використати впродовж 10 годин.
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ	Зберігати в темному, недоступному для дітей місці при температурі від 2 до 8 °C. Не заморожувати!
УПАКОВКА ТА ФАСУВАННЯ	Пластикові флакони по 500 доз (250 мл) або 1000 доз (500 мл).
НАЗВА, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І МІСЦЕ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ	ТОВ „БІОТЕСТЛАБ” 08600 Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська 57-А. Адреса виробництва: 03143 м. Київ, вул. Академіка Лебедева 1; 08600 Київська обл., м. Васильків, вул. Лістрового Олександра, буд. 1/3.
ПРАВИЛА ВІДПУСКУ	За рецептом
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ	Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до “Вказівки про порядок пред'явлення рекламаций на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині” від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.