

ТОЛТРАСАН-50



Розчин для перорального застосування

ОПИС	Прозорий розчин від світло-жовтого до жовтого кольору.
СКЛАД	1 мл препарату містить діючу речовину толтразурил - 50 мг. Допоміжні речовини: поліетиленгліколь, моноетаноламін, полісорбат-80.
ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ	ATCvet QP51, антипротозойні ветеринарні препарати (ендектоциди (QP51AJ01, толтразурил) Препарат містить діючу речовину толтразурил, похідне з групи триазинтріону, з широким спектром дії, який діє на еймерій: <i>E. adenoides</i> , <i>E. alabamensis</i> , <i>E. arloingi</i> , <i>E. bovis</i> , <i>E. brunetti</i> , <i>E. guevarai</i> , <i>E. maxima</i> , <i>E. meleagridis</i> , <i>E. mitis</i> , <i>E. necatrix</i> , <i>E. scabra</i> , <i>E. tenella</i> , <i>Isospora suis</i> , <i>E. zuernii</i> ; та інших видів на всіх стадіях їх внутрішньоклітинного розвитку. Толтразурил порушує внутрішньоклітинні стадії розвитку еймерій, впливаючи на мерогонію, мікро- та макрогамети. Він гальмує процес ділення ядер еймерій та зменшує активність мітохондрій, що відповідають за респіраторний метаболізм. В організмі тварин толтразурил частково метаболізується з утворенням сульфоксид- та сульфон-похідних. В подальшому – майже повністю виводиться з фекаліями у незмінній формі або в формі толтразурилсульфону чи толтразурилсульфоксиду. Препарат не має мутагенної, канцерогенної і тератогенної дії.
ЗАСТОСУВАННЯ	Профілактика і лікування молодняку великої рогатої худоби, овець, свиней, кролів та сільськогосподарської птиці (бройлери, племінна птиця, ремонтний молодняк курей, батьківське і бройлерні стада, м'ясні індики) при еймеріозах викликаних еймеріями чутливими до толтразурилу.
ДОЗУВАННЯ	Препарат застосовують перорально, індивідуально або груповим способом з питною водою у наступних дозах: <i>телятам</i> з 2-х тижневого віку – 0,3 мл на 1 кг маси тіла (15 мг толтразурилу на кг м.т.) одноразово; <i>ягнятам</i> з 2-х тижневого віку- одноразово у дозі 0,4 мл на 1 кг маси тіла (20 мг толтразурилу на кг м. т.) тварини одноразово; <i>поросят</i> на 3-5 добу життя – 0,4 мл препарату на 1 кг маси тіла (20 мг толтразурилу на кг м.т.) тварини, але не менше 0,5 мл і не більше 2 мл на тварину одноразово; <i>кролям</i> з 4-х тижневого віку - 0,14 мл на 1 кг маси тіла одноразово (7 мг толтразурилу на кг м.т.); <i>птиці</i> - 0,5 мл на 1 л питної води, яку випоюють впродовж 48 годин, або 1,5 мл препарату на 1 л питної води, яку випоюють птиці по 8 годин впродовж двох діб.

ДОЗУВАННЯ	Готовий до використання розчин препарату придатний 24 години. Птиця повинна отримувати воду з препаратом як єдине джерело питної води. У важких випадках захворювання при необхідності курс лікування повторюють через 5 днів. Для досягнення максимального профілактичного ефекту і зниження виділення кількості ооцист у зовнішнє середовище, у неблагополучних по кокцидіозу господарствах препарат застосовують тваринам до появи перших ознак захворювання у стаді тварин.
ПРОТИПОКАЗАННЯ	Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Не застосовувати препарат великій рогатій худобі та вівцям молодшим 2-х тижневого віку, кролям молодшим - 4-х тижневого віку, великій рогатій худобі і поросяткам - старшим 9-и місяців. Не застосовувати самкам під час лактації та вагітності, курям-несучкам.
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ	Забій тварин на м'ясо дозволяється через: поросята - 77 днів, телята - 63 доби, вівці - 42 доби, кролі - 70 днів, птиця - 16 днів після останнього застосування препарату. Отримане до зазначеного терміну м'ясо утилізують або згодовують непродуктивним тваринами, залежно від висновку лікаря ветеринарної медицини. Персонал, який працює з препаратом, повинен дотримуватись основних правил гігієни та безпеки прийнятих при роботі з ветеринарними препаратами.
ФОРМА ВИПУСКУ	Флакони зі скла по 10, 50, 100 мл або полімерних матеріалів по 10, 50, 100, 500, 1000 мл.
ЗБЕРІГАННЯ	Суше, темне, недоступне для дітей місце за температури від 5°C до 25°C. Термін придатності - 2 роки, після першого відкриття флакону - 14 днів за температури від 5°C до 25°C. Готовий до використання розчин препарату придатний 24 години.

ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ!

ВЛАСНИК РЕЄСТРАЦІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ:	ТОВ «БІОТЕСТЛАБ» Україна, 08601, Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, 57А.
ВИРОБНИК ГОТОВОГО ПРОДУКТУ:	ТОВ «БІОТЕСТЛАБ» Україна, 08601, Київська область, Обухівський район, м. Васильків, вул. Лістового Олександра, 1/3 www.biotestlab.ua.