BOVIMUN 4, БОВІМУН 4

Склад	**До складу вакцини входять два компоненти (суспензія в якості розчинника ліофілізату) з однаковою кількістю доз. Одна доза препарату містить:** **Вакцинні штами в суспензії (до інактивації):** **вірус ринотрахеїту ВРХ, штам "ВМ" ≥ $10^{7,0}$ ТЦД$_{50}$;** **вірус парагрипу-3 (PI-3), штам "BR-11" ≥ 480 ГАО;** **вірус діареї ВРХ, штам "D-13" ≥$10^{6,0}$ ТЦД$_{50}$;** **Вакцинний штам в ліофілізованому компоненті:** **Живий вірус респіраторно-синцитіальної хвороби ВРХ, штам "РС-09" ≥$10^{4,0}$ ТЦД$_{50}$**
Фармацевтична форма	Суспензія і ліофілізат.
Імунобіологічні властивості	Вакцина стимулює утворення активного імунітету проти респіраторно-репродуктивного комплексу захворювань ВРХ (інфекційного ринотрахеїту, парагрипу-3, вірусної діареї та респіраторно-синцитіальної хвороби), не володіє лікувальними властивостями.
Вид тварин	Велика рогата худоба (ВРХ).
Показання до застосування	Для профілактики захворювання великої рогатої худоби на інфекційний ринотрахеїт, вірусну діарею, парагрип-3 та респіраторно-синцитіальну інфекцію ВРХ.
Протипоказання	Не дозволяється вакцинувати хворих та виснажених тварин.
Застереження при застосуванні	- підігріти вакцину до температури 20-25 °С; - перед застосуванням суспензію ретельно збовтати. При довготривалому зберіганні можливе утворення незначного осаду, що легко розбивається при струшуванні в гомогенну суспензію; - розчинити ліофілізований компонент в суспензії; - вакцину застосувати впродовж 3-х годин після розчинення.
Взаємодія з іншими засобами	Не вивчалися, тому не рекомендується застосовувати одночасно з іншими вакцинами та терапевтичними засобами. Не змішувати компоненти вакцини з різних серій.
Особливі вказівки при вагітності, лактації	Застосовування на будь-якій стадії тільності та лактації не викликає негативної реакції.
Спосіб застосування та дози	5 мл вакцинної суспензії перенести шприцем у флакон з ліофілізованим компонентом, злегка збовтати до повного розчинення ліофілізату, відібрати шприцем розчинений матеріал та перенести до флакону з суспензією. Провести процедуру повторно для повного перенесення розчиненого ліофілізованого компоненту у флакон з суспензією. Вакцину застосовувати внутрішньом'язево в ділянку шийних м'язів. Дозування: тваринам, починаючи з 4-х тижневого віку, незалежно від ваги, віку та статі вводять по 3 мл вакцини. Бики: Вакцинувати двохкратно з інтервалом 21-30 діб. В подальшому вакцинацію проводити раз на рік. Корови та телички: Вакцинувати двохкратно за 60-50 та 30-20 діб до першого осіменіння. В подальшому вакцинацію проводити раз на рік.

Побічні ефекти	Після вакцинації у тварин іноді може спостерігатися припухлість в місці введення та підвищення температури тіла до 1°С, які зникають через 2-3 дні без лікування.
Передозування (симптоми, невідкладні заходи)	Застосування двох доз вакцини не має негативного впливу на здоров'я тварин.
Період виведення (каренції)	Нуль діб.
Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу, які застосовують ВІП	Дотримуватись правил асептики, особистої гігієни та техніки безпеки при проведенні вакцинації. У разі випадкової самоїн'єкції необхідно негайно звернутися за медичною допомогою, маючи при собі листівку-вкладку на даний препарат.
Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним ВІП, способи його знешкодження і утилізації	Вакцину з закінченим терміном придатності, невикористану впродовж 3-х годин після розчинення, порожні флакони, шприці та голки знезаразити кип'ятінням впродовж 30 хвилин.
Термін придатності	18 місяців з дати виготовлення. Вакцину використовувати впродовж 3-х годин після розчинення.
Умови зберігання і транспортування	Зберігати за температури від 2 до 8 °С у темному, недоступному для дітей місці. Не заморожувати.
Упаковка	До складу вакцини входять два компоненти (суспензія в якості розчинника ліофілізату), розфасовані у флакони зі скла або пластику закриті пробками та закатані алюмінієвими ковпачками, з однаковою кількістю доз (по 10 або 30 доз).
Для застосування у ветеринарній медицині!	
Власник реєстраційного посвідчення	ТОВ "БІОТЕСТЛАБ" вул. Володимирська, буд. 57-А, м. Васильків, Київська обл., 08600, Україна
Виробник готового продукту	ТОВ "БІОТЕСТЛАБ" вул. Володимирська, буд. 57-А, м. Васильків, Київська обл., 08600, Україна
Правила відпуску	Без рецепту.
Додаткова інформація	Якщо препарат не відповідає вимогам листівки-вкладки або виникли ускладнення, застосування цієї серії негайно припиняють і повідомляють Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (ДНКІБШМ) та постачальника (виробника). Одночасно з посланцем у ДНКІБШМ направляють, відповідно до "Вказівки про порядок пред'явлення рекламацій на біологічні препарати, що призначені для застосування у ветеринарній медицині" від 03.06.98 № 2 три нерозкриті флакони цієї серії препарату за адресою: 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30, ДНКІБШМ.