

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ МОЛОКА

1

В ЯКУ ТАРУ ВІДБИРАТИ ЗРАЗКИ МОЛОКА?



Використовуйте чистий пластиковий посуд (пробірки), що герметично закривається.

2

ЯКІ УМОВИ ТРАНСПОРТУВАННЯ МОЛОКА?



Зразки до лабораторії необхідно відправляти «на холоді» якомога швидше. Їх можна зберігати до 5 діб при охолодженні до +2..8 °C, а за температури мінус 20 °C – протягом 6 місяців.

3

ЧИ ПОТРІБНО ВИКОРИСТОВУВАТИ КОНСЕРВАНТИ?



До зразків молока не можна додавати жодних консервантів. Це може вплинути на достовірність отриманих результатів.

ПРАВИЛА ВІДБОРУ ПРОБ МОЛОКА

ТАНКОВА ПРОБА

Достатньо відібрати один зразок збірного молока з кожної цистерни в господарстві. Якщо неможливо відібрати зразок з цистерни, можна відібрати один зразок з молоковозу. Якщо молоковоз збирає молоко з більш ніж двох різних ферм, в такому випадку відбирати зразки недоцільно.

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОБА

1

Промаркуйте пробірки до відбору проб (дата, ферма, корова, чверть)

2

Щіткою очистіть соски та вим'я від підстилки, шерсті та іншого бруду. В разі значного забруднення ретельно вимийте і висушіть соски та вим'я перед початком відбору проб молока. Вим'я мийте у крайньому випадку.

3

Здоїть молоко, не відбираючи перші струмені. Обстежте молоко та молочні чверті вимені на присутність ознак клінічного маститу.

4

Обробіть всі чверті вимені ефективним дезінфікуючим засобом для переддоїльної обробки сосків та зачекайте мінімум 30 секунд.

5

Ретельно насухо протріть соски індивідуальним рушником.

6

Протріть соски (10-15 секунд) ватними або марлевими кульками чи спеціальними серветками злегка змоченими 70% спиртом, починаючи з віддаленої частини вимені. Сосок очищують доти, поки не буде видно бруду на ватному тампоні. Одну ватну кульку або тампон, змочений спиртом, слід використувати для одного соска. Будьте обережні, не торкайтеся очищеного кінчика соска. Уникайте контакту очищених сосків з брудними кінцівками та хвостом.

7

Починайте відбір зразків молока від найближчих сосків, рухаючись до дальніх. Зніміть кришку з пробірки чи флакону, але запобігайте забрудненню її внутрішньої поверхні. Завжди тримайте відкритий кінець кришки вниз. При відборі зразка тримайте пробірку під кутом 45 градусів. Не торкайтеся краями пробірки соска вимені. Відберіть від 1-го до 3-х струменів молока й одразу ж герметично закрийте пробірку.

8

Щоб відібрати збірну пробу (з усіх чвертей вимені в одну пробірку), починайте з ближніх сосків, ідучи до сосків на віддаленій частині вимені (1-2 мл молока відбирають з кожної чверті).

9

Відібрані зразки молока мають бути негайно охолоджені (покладені на лід чи поміщені в холодильник). Якщо неможливо дослідити зразки протягом 48 годин після відбору, то їх необхідно заморозити.




BOVIMUN MAST

БІЛЬШЕ ЯКІСНОГО МОЛОКА

STREPTOCOCCUS AGALACTIAE
STREPTOCOCCUS UBERIS
STAPHYLOCOCCUS AUREUS
ESCHERICHIA COLI

ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ МАСТИТІВ КОРІВ, ІНАКТИВОВАНА



> менше маститів –
більше молока

> менше витрат
на лікування


> менше
соматичних
клітин

Виробник:




ТОВ "БІОТЕСТЛАБ"

тел.: +380 44 245-77-25 | www.biotestlab.ua



Генеральний дистрибутор:




ТОВ "ТД БІОТЕСТЛАБ"

тел.: 0 800 213-235 | www.biotestlab.shop

1 ДОЗА ВАКЦИНИ МІСТИТЬ АКТИВНОДІЮЧІ КОМПОНЕНТИ (ДО ІНАКТИВАЦІЇ)

- *Streptococcus agalactiae*, штам St.ag-19 ≥ 8,0 lg KOE
- *Streptococcus uberis*, штам St.ub-19 ≥ 8,0 lg KYO
- *Staphylococcus aureus*, штам Staph.au-19 ≥ 8,0 lg KOE
- *Escherichia coli*, штам UA J5≥ 9,0 lg KOE




СХЕМИ ВАКЦИНАЦІЇ



ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ВАКЦИНИ БОВІМУН МАСТ

На господарстві **Вінницької області** (301 голова дійного стада) застосували вакцину **БОВІМУН МАСТ** та через 6 місяців після вакцинації отримали позитивні результати:





РОЗРАХУНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВАКЦИНИ БОВІМУН МАСТ ПРОТЯГОМ 6 МІСЯЦІВ

Вакцинація	Показник	Лікування корів		Вибракування		Трудовитрати		Вакцинація+ дослідження	ВСЬОГО	Сортність молока
		за маститу	за ендометриту	молока	корів	лікаря	доярки			
До	Сума, грн	25 голів 29 400	30 голів 23 850	25 голів 250 056	5 голів 450 000	4 372,5	1 848	-	759 526,50	1 1290 028,0
Після	Сума, грн	5 голів 5 880	2 голови 1 590	5 голів 51 943,20	3 голови 270 000	556,50	235,20	57 150	387 354,90	11 726 177,40

ПРИБУТОК: 372 171,60 + 436 149 = 808 320,60 грн. На 1 грн витрат отримано **14,14 грн** прибутку від вакцинації.

Вакцинація тварин препаратом **БОВІМУН МАСТ** виробництва «БІОТЕСТАБ» на господарствах дає змогу покращити якість молочної сировини. Дані динаміки виробничих показників вказують на ефективність вакцинації впродовж шести місяців після застосування та досягнення економічної ефективності за рахунок покращення якості молочної сировини та динаміки виробничих показників. Дані економічних показників вказують, що застосування вакцини з профілактичною метою протягом 6 місяців дозволяє попередити витрати, підвищити якість молочної сировини, досягаючи значного економічного ефекту.

Виробничі показники по стаду на 6-й місяць після вакцинації **БОВІМУН МАСТ** становили:



Вакцинація тварин препаратом **БОВІМУН МАСТ** виробництва «БІОТЕСТАБ» на господарстві Київської області дає змогу покращити якість молочної сировини. Дані динаміки виробничих показників вказують на ефективність вакцинації впродовж шести місяців після застосування.

РОЗРАХУНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ВАКЦИНИ БОВІМУН МАСТ ПРОТЯГОМ 6 МІСЯЦІВ

Вакцинація	Показник	Лікування корів		Вибракування		Трудовитрати		Вакцинація+ дослідження	ВСЬОГО	Сортність молока
		за маститу	за ендометриту	молока	корів	лікаря	доярки			
До	Сума, грн	32 голови 122 726,40	32 голови 223 976,40	32 голови 347 136	6 голів 72 000	2 542,08	2 150,40	-	770 531,28	8 806 320
Після	Сума, грн	5 голів 2 399,70	2 голови 13 998,60	5 голів 56 460	3 голови 36 000	278,04	253,20	44 400	153 789,54	9 146 520

ПРИБУТОК: 616 741,74 + 340 200 = 956 941,74 грн. На 1 грн витрат отримано 21,55 грн прибутку від вакцинації.